

# CHIAVE DICOTOMICA DI RICONOSCIMENTO DEI GAMBERI D'ACQUA DOLCE

Specie	<i>Austropotamobius italicus</i>	<i>Faxonius limosus</i>	<i>Procambarus clarkii</i>	<i>Procambarus fallax f. virginialis</i>	<i>Pacifastacus leniusculus</i>	<i>Pontastacus leptodactylus</i>
Colore	Bruno verdastro, con addome e zampe chiare (da cui il nome)	Variabile, da bruno scuro a verde oliva	Rosso-bruno negli adulti, grigio verde nei giovani	Bruno verdastro, con marmoreggiatura laterale	Rosso/marrone, più brillante sul ventre	Variabile, dal bruno giallastro al verde oliva
Dimensioni	12 cm	Max 12cm	Anche oltre i 15cm	In genere 10cm, max 13	Anche oltre i 16cm nei maschi	Fino a 25cm per 200g di peso
Rostro	Margini divergenti, carena centrale, un solo paio di creste post orbitali	Senza carena centrale, margini paralleli, cresta post orbitale singola	Senza carena mediana, margini divergenti, un solo paio di creste post orbitali	Senza carena centrale, margini divergenti	Margini lisci e paralleli, con carena mediana	Lungo, appuntito e con margini quasi paralleli. Cresta mediana dentellata
Spina sul carpopodite	Assente	Presente, ma meno pronunciato che in <i>P. clarkii</i>	Presente	Presente	Assente	Assente
Areola	Aperta	Aperta	Chiusa	Aperta	Aperta	Aperta
Chele	Robuste, con evidente scalino sul dito fisso e leggermente granulose	Margine interno regolare e liscio, punta uncinata con bande nere e arancioni	A forma di S, coperta di numerosi tubercoli	Piccole, debolmente granulose	Di grandi dimensioni, rosso acceso sul lato inferiore e con macchia bianco-azzurrognola sulla giunzione tra porzione mobile e fissa	Di forma caratteristica, molto allungate e sottili, tubercolate ma con margine interno liscio
Altri aspetti	Aspetto piuttosto massiccio, chele particolarmente imponenti nei maschi adulti	Due file di macchie rosse ben evidenti sul dorso dell'addome. Spine su entrambi i lati del carapace	Sottile banda scura su entrambi i lati dell'addome e striscia chiara sulla superficie dorsale. Particolarmente aggressivi	Marmoreggiatura sempre presente, anche se a volte limitata alle aree laterali del carapace. Solo femmine	Specie di media dimensioni, di aspetto liscio, presenta due creste post orbitali che lo differenzano da <i>A. italicus</i>	Carapace tuberculato e spinoso lateralmente. Due creste post orbitali ben sviluppate

Presenza di uno sperone evidente sul lato interno del carpodite

NO

SÌ



Creste post-orbitali

Solchi del carapace uniti

1 PAIO

2 PAIA

SÌ

NO

*Austropotamobius italicus*

*Procambarus clarkii*



Chele allungate, con macchia bianco-azzurrognola assente

Marmoreggiatura evidente (almeno sui fianchi del carapace)

SÌ

NO

SÌ

NO

*Pontastacus leptodactylus*

*Procambarus fallax f. virginalis*

*Pacifastacus leniusculus*

*Faxonius limosus*

